URGOTUL® FLEX

TECHNOLOGY LIPIDO-COLLOID TLC

Interfase Lípido-coloide Flexible

Indicaciones: Úlceras varicosas y por decúbito poco o moderadamente exudadas.

- Flexible
- Heridas agudas y crónicas
- Cicatrización en medio húmedo
- Retirada sin dolor y no traumática
- Proliferación de fibroblastos

Urgotul® Flex

Acondicionado en estuches con apósitos esterilizados individuales en sobres.

TAMAÑOS	U/C	C. N.
5 x 5 cm	10	157041.3
10 x 12 cm	3	400126.6 •
10 x 12 cm	10	157027.7
15 x 15 cm	3	494021.3 •
15 x 15 cm	10	157028.4
10 x 40 cm	10	157029.1

• Financiado por la Seguridad Social solo en úlceras varicosas y por decúbito

www.urgomedical.es

URGO MEDICAL

URGOTUL® FLEX

DESCRIPCIÓN

• Interfase lípido-coloide, esterilizada, no adhesiva y no oclusiva, procedente de la tecnología lípido–coloide, una novedad exclusiva patentada por Laboratorios Urgo.

COMPOSICIÓN: **Urgotul® Flex** es un apósito lípido-coloide flexible, fabricado con un tejido de poliéster impregnado con partículas hidrocoloides (carboximetilcelulosa) y vaselina.

MODO DE ESTERILIZACIÓN: Esterilizado por radiación ionizante.

PROPIEDADES

• En contacto con el exudado de la herida, las partículas hidrocoloides de **Urgotul® Flex** reaccionan con la vaselina para formar una interfase lípido-coloide, creando un medio húmedo favorable para el proceso de cicatrización.
• Graso en su composición sin serlo al tacto, **Urgotul® Flex** no se adhiere a la herida ni a la piel circundante. La eliminación del apósito no es dolorosa ni traumática para la herida.
• **Urgotul® Flex** favorece una cicatrización rápida al estimular la proliferación de los fibroblastos.
• Flexible y adaptable, **Urgotul® Flex** es apropiado para heridas de difícil localización.

INDICACIONES

• **Urgotul® Flex** está indicado para el control tanto de heridas agudas (quemaduras, abrasiones o raspaduras, heridas post operatorias), como de heridas crónicas (úlceras de la pierna, úlceras de pie diabético) en la etapa de granulación y epitelialización.
• **Urgotul® Flex** está también indicado para el control de la epidermólisis bullosa.
• Al ser flexible, **Urgotul® Flex** está particularmente indicado en el recubrimiento de lesiones anfractuosas o de difícil localización, y en el mechado de heridas cavitadas.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

MODO DE EMPLEO:

1 - Preparación de la herida:
- Limpiar la herida con suero fisiológico.
- En caso de utilizar un antiséptico, de manera previa, aclarar cuidadosamente la herida con suero fisiológico antes de aplicar **Urgotul® Flex**.

2 - Aplicación del apósito:
- Quitar la película protectora transparente.
- Aplicar **Urgotul® Flex** a la herida en una sola capa.
- Con objeto de adaptar el tamaño de apósito a la lesión, **Urgotul® Flex** puede recortarse utilizando material estéril.
- Cubrir **Urgotul® Flex** con un apósito secundario adecuado para absorber el exudado de la herida.
- Mantener el apósito secundario con una venda extensible, un esparadrapo adhesivo o una venda tubular elástica.

3 - Renovación del apósito:
- **Urgotul® Flex** puede ser cambiado cada 2 a 4 días y mantenerse colocado durante 7 días en función de la herida.
- En pacientes con epidermólisis bullosa, el apósito debería ser cambiado después de 1 a 3 días.

PRECAUCIONES DE EMPLEO:

• **Urgotul® Flex** puede adherirse a los guantes de látex. En tal caso, humedecer los guantes con solución salina, lo que facilitará la manipulación del apósito.

• Si aparecen signos de infección local, se puede continuar el tratamiento bajo supervisión médica, aunque en este caso es preferible usar **Urgotul® S.Ag** o **Urgotul® Ag**.

• En caso de heridas profundas, no es necesario aplicar **Urgotul® Flex** en varias capas.

• En caso de lesiones profundas, anfractuosas o fistulosas, dejar una parte del apósito **Urgotul® Flex** visible y accesible al exterior de la lesión.

• No reesterilizar.

• Almacenar **Urgotul® Flex** en posición horizontal, y al abrigo de la humedad y el calor (temperatura inferior a 25°C).

ESTATUS REGLAMENTARIO

• Producto sanitario de clase II b.